

T-79.144

Syksy 2003

Logiikka tietotekniikassa: perusteet


Laskuharjoitus 4 (lauselogiikka, kappaleet 4.4 - 5.3)

30.9. – 3.10.2003

1. Peircen nuoli määritellään seuraavasti:

$$(A \downarrow B) \Leftrightarrow_{def} \neg A \wedge \neg B.$$

Määrittele sille semanttisen taulun säänöt.



2. Todista semanttisella taululla

- $A \rightarrow (B \rightarrow B),$
- $(A \rightarrow B) \wedge (B \rightarrow C) \rightarrow (A \rightarrow C),$
- $(A \rightarrow B) \wedge (A \rightarrow C) \rightarrow (A \rightarrow B \wedge C)$ ja
- $(A \rightarrow C) \wedge (B \rightarrow C) \wedge (A \vee B) \rightarrow C.$

Todistettavien kaavojen negaatioille konstruoitaan semantiset taulut. Taulun kaikkien haarojen tulee sulkeutua, jotta taulun juressa $F(\phi)$ oleva lause ϕ on pätevä. Jos taulun haara sulkeutuu ennen koko puun valmistumista, kyseistä haaraa ei enää laajenneta sääntöjä sovellettaessa.

Huomaa, että semanttista taulua käytetään itse asiassa lauseen $\neg\phi$ mallien selvittämiseen. Jos taulun kaikki haarat menevät ristiriitaisikei lauseella $\neg\phi$ ei ole mallia (eli $\neg\phi$ on toteutumaton), joten lause ϕ pätevä.

Ratk.


a) $A \rightarrow (B \rightarrow B)$:

$$\begin{array}{c} E(A \rightarrow (B \rightarrow B)) \\ | \\ T(A) \\ | \\ E(B \rightarrow B) \\ | \\ T(B) \\ | \\ E(B) \\ \otimes \end{array}$$


b) $(A \rightarrow B) \wedge (B \rightarrow C) \rightarrow (A \rightarrow C)$:

$$\begin{array}{c} E((A \rightarrow B) \wedge (B \rightarrow C) \rightarrow (A \rightarrow C)) \\ | \\ T((A \rightarrow B) \wedge (B \rightarrow C)) \\ | \\ E(A \rightarrow C) \\ | \\ T(A \rightarrow B) \\ | \\ T(B \rightarrow C) \\ | \\ T(A) \\ | \\ E(C) \\ / \quad \backslash \\ E(A) \quad T(B) \\ \otimes \quad | \\ \quad E(B) \quad T(C) \\ \otimes \quad \otimes \end{array}$$

c) $(A \rightarrow B) \wedge (A \rightarrow C) \rightarrow (A \rightarrow B \wedge C)$:



d) $(A \rightarrow C) \wedge (B \rightarrow C) \wedge (A \vee B) \rightarrow C$:




3. Tutki semanttisella taululla, pitääkö annettu väittämä paikkansa. Jos ei, anna perusteluksi totuusjakelu, jossa se ei ole tosi (vastaesimerkki).

- a) $\{B \rightarrow A, C \rightarrow B, (C \rightarrow A) \rightarrow D\} \models D$
- b) $\{A \rightarrow C, A \vee B, \neg D \rightarrow \neg B\} \models C \rightarrow D$
- c) $\models (A \rightarrow (B \rightarrow C)) \rightarrow ((A \rightarrow C) \rightarrow (A \rightarrow B))$
- d) $\models (\neg B \rightarrow (A \rightarrow C)) \rightarrow (A \rightarrow (B \vee C))$


Ratk.

Loogista seuraavuutta tutkittaessa asetetaan taulun juureen kaikki lausejoukon lauseet totena ja tutkittava lause epätotena. Mikäli nyt kaikki puun haarat sulkeutuvat ristiriidan takia, tiedetään että tutkittava lause ei voi olla

epäatosi, mikäli kaikki lausejoukon lauseet ovat toisia, joten lause on looginen seuraavuus lausejoukosta.




Koska taulu sulkeutui, on D looginen seuraus lausejoukosta.




Taulu ei sulkeutunut, joten $C \rightarrow D$ ei ole looginen seuraavuus lausejoukosta. Puun aukiolevasta haarasta voidaan lukea vastaesimerkki, saadaan totuusjakelu $\mathcal{A} = \{A, C\}$.

- c) **Ratk.** Merkintä $\models \phi$ tarkoittaa siis, että lause ϕ on pätevä. Todistus siis tapahtuu konstruoimalla puu, jonka juuressa on lauseen negaatio.



Koska taulu ei sulkeutunut, lause ei ole pätevä. Vastamalli voidaan lukea avoimesta haarasta, tässä tapauksessa esim. oikeimmasta saadaan totuusjakelu $\mathcal{A} = \{A, C\}$.


d) **Ratk.**



Taulu sulkeutui, joten lause on pätevä.

4. Palataan insinööri Sörsselssönin laatimiin vaatimuksiin liikennevalolle yksisuuntaisten katujen risteyksessä. Osoita semanttisella taululla, että väittämä "liikennevalojen punaiset lamput eivät pala yhtäaikaisesti" seuraa loogisesti laatimastasi lausejoukosta.

Ratk.



5. Osoita Hilbertin ja Suppesin todistusjärjestelmillä (opetusmoniste, kappa-leet 5.1 ja 5.2) seuraavat väittämät.

a) $\vdash P \rightarrow P$

Ratk. (Hilbert)

1. $(P \rightarrow ((P \rightarrow P) \rightarrow P))$ [A1]
2. $((P \rightarrow ((P \rightarrow P) \rightarrow P)) \rightarrow ((P \rightarrow (P \rightarrow P)) \rightarrow (P \rightarrow P)))$ [A2]
3. $((P \rightarrow (P \rightarrow P)) \rightarrow (P \rightarrow P))$ [MP:1,2]
4. $(P \rightarrow (P \rightarrow P))$ [A1]
5. $(P \rightarrow P)$ [MP:3,4]

(Suppes)

1. P [apuoletus]
2. $\neg\neg P$ [KNT]
3. P [KNE]
4. $P \rightarrow P$ [ET:1,3]

b) $\{P \rightarrow Q, Q \rightarrow R\} \vdash P \rightarrow R$

Ratk. (Hilbert)

1. $(Q \rightarrow R)$ [P2]
2. $((Q \rightarrow R) \rightarrow (P \rightarrow (Q \rightarrow R)))$ [A1]
3. $(P \rightarrow (Q \rightarrow R))$ [MP:1,2]
4. $((P \rightarrow (Q \rightarrow R)) \rightarrow ((P \rightarrow Q) \rightarrow (P \rightarrow R)))$ [A2]
5. $((P \rightarrow Q) \rightarrow (P \rightarrow R))$ [MP:3,4]
6. $(P \rightarrow Q)$ [P1]
7. $(P \rightarrow R)$ [MP:5,6]

(Suppes)

1. $P \rightarrow Q$ [P1]
2. $Q \rightarrow R$ [P2]
3. P [apuoletus]
4. Q [MP:3,2]
5. R [MP:4,3]
6. $P \rightarrow R$ [ET:3,5]

c) $\{P, Q \rightarrow (P \rightarrow R)\} \vdash Q \rightarrow R$

Ratk. (Hilbert)

- | | |
|--|----------|
| 1. P | [P1] |
| 2. $(Q \rightarrow (P \rightarrow R))$ | [P2] |
| 3. $(P \rightarrow (Q \rightarrow P))$ | [A1] |
| 4. $(Q \rightarrow P)$ | [MP:1,3] |
| 5. $((Q \rightarrow (P \rightarrow R)) \rightarrow ((Q \rightarrow P) \rightarrow (Q \rightarrow R)))$ | [A2] |
| 6. $((Q \rightarrow P) \rightarrow (Q \rightarrow R))$ | [MP:2,5] |
| 7. $(Q \rightarrow R)$ | [MP:4,6] |

(Suppes)

- | | |
|--------------------------------------|-------------|
| 1. P | [P1] |
| 2. $Q \rightarrow (P \rightarrow R)$ | [P2] |
| 3. Q | [apuoletus] |
| 4. $P \rightarrow R$ | [MP:3,2] |
| 5. R | [MP:1,4] |
| 6. $Q \rightarrow R$ | [ET:3,5] |